

|    |  | 休薬終了日 |
|----|--|-------|
|    | Day1   | Day14 |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>レスタシユー7錠10mg … 5錠<br/>1日1回<br/>オキサリプラチン開始30分前に内服<br/>1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1<br/>1日</p>   |       |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>静脈内注射 … 1<br/>大塚生食注(20ml) … 1管<br/>CVポート又はPICC留置時の投与前フラッシュ用<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1<br/>大塚生食注(100ml) … 1瓶<br/>オプジーホ注【規格分解用】 … 240mg<br/>0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与<br/>希釈後の濃度が1.9mg/mL以上となるよう調製<br/>30分間かけて<br/>本管①<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋<br/>デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶<br/>デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管<br/>フモチジン注射液20mg「トーフ」2mL(先発:ガスター) … 1管<br/>15分間かけて<br/>本管②<br/>点滴 … 1<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋<br/>レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg<br/>120分間かけて<br/>側管<br/>本管③と同時に<br/>点滴 … 1<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋<br/>オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg<br/>120分間かけて<br/>本管③<br/>レボホリナートと同時に<br/>点滴 … 1<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg<br/>全開で<br/>本管④<br/>点滴 … 1<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1<br/>大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>本管⑤<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬】 … 1mL<br/>フルオウラシル注(バクスター-230mL用)【規格分解】 … 1mg<br/>46分間かけて<br/>バクスターインフュージョンポンプLV5に充填<br/>本管⑥<br/>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアーロック) … 1筒<br/>インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。<br/>管注 … 1<br/>1回</p> |       |