

mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ療法<2クール目以降>

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】 レスタミン-7錠10mg … 5錠 アブレピタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <hr/> <p>【4mg】テ'カド'ロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 3日</p> <hr/> <p>アブレピタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回</p> <hr/> <p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 テ'カド'ロ注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テ'カド'ロ注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(ビロイ)【規格薬剤】… 1mL 大塚蒸留水(20ml) … 2管 ビロイ点滴静注用400mg/m²【規格分解用】… 1mg 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管③ ビロイ投与後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】… 1mg 120分間かけて 側管 本管④と同時に 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリヂン注【規格分解用】… 1mg 120分間かけて 本管④ レボホリナートと同時に 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フリオウラル注【規格分解用】… 1mg 全開で 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 1回</p> <hr/> <p>生食注シリジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 フリオウラル注(バクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg 46時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑦ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回</p> <hr/> <p>生食注シリジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。 側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回</p>	