

ダウノルビシン シタラビン【リポソーム製剤】療法（地固め療法）

			休薬終了日
	Day1	Day3	Day35
投薬			
注射	■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 15 分間かけて 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ビキセオス点滴前と点滴終了後のフラッシュ用 1回 ----- (精密持続)点滴注射 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 大塚蒸留水(20ml) … 2管 ビキセオス配合静注用【規格分解用】 … 1U 90 分間かけて 投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 1回	■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管 15 分間かけて 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ビキセオス点滴前と点滴終了後のフラッシュ用 1回 ----- (精密持続)点滴注射 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 大塚蒸留水(20ml) … 2管 ビキセオス配合静注用【規格分解用】 … 1U 90 分間かけて 投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 1回	