

		休業終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタシコ-ワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>パロ/セロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ファモチシン注射液20mg「ト-ワ」 2mL(先発:カスター) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペバシズマブ注【規格分解用】 … 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管③ ペバシズマブ投与後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p>	

注射

テルモ糖注5%(250mL) … 1袋
レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg
120 分間かけて
側管
本管④と同時に
点滴 … 1
1回

テルモ糖注5%(250mL) … 1袋
オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg
120 分間かけて
本管④
レボホリナートと同時に
点滴 … 1
1回

大塚生食注(50ml) … 1瓶
フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg
全開で
本管⑤
点滴 … 1
1回

点滴 … 1
大塚生食注(50ml) … 1瓶
本管⑥
1回

生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL
フルオウラシル注(バクスター230mL用)【規格分解 … 1mg
46 時間かけて
バクスターインフュージョンポンプLV5に充填
本管⑦
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1
1回

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒
インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。
管注 … 1