

FOLFIRI+パニツムマブ療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコ-7錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>ミノマイシンカプセル100mg … 2C 1日2回 朝・夕 食後 14日</p> <p>-----</p> <p>ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g/本（先発:ヒルトイ） … 2本 1日頻回 保湿 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	

注射

■---【注射】

大塚生食注(20ml) … 1管

逆血確認用

静脈内注射 … 1

1回

パロノセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキン) … 1袋

デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶

デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管

15分間かけて

本管①

点滴 … 1

1回

大塚生食注(50ml) … 1瓶

5分間かけて

ベクティビックス投与前

本管②

点滴 … 1

1回

大塚生食注(100ml) … 1瓶

ベクティビックス点滴静注【規格分解用】 … 1mg

60分間かけて

インラインフィルター使用

本管③

点滴 … 1

1回

大塚生食注(50ml) … 1瓶

5分間かけて

本管④

ベクティビックス投与終了後

点滴 … 1

1回

テルモ糖注5%(250mL) … 1袋

レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg

120分間かけて

側管

イリノテカンと同時に

点滴 … 1

1回

テルモ糖注5%(250mL) … 1袋

イリノテカン注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg

90分間かけて

本管⑤

レボホリナートと同時に

点滴 … 1

1回

大塚生食注(50ml) … 1瓶

フルオロラシル注【規格分解用】 … 1mg

全開で

本管⑥

点滴 … 1

1回

点滴 … 1

大塚生食注(50ml) … 1瓶

本管⑦

1回

生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL

フルオロラシル注(バクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg

46時間かけて

バクスターインフュージョンポンプLV5に充填

本管⑧

抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1

1回

生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアーロック) … 1筒

インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。

管注 … 1

1回