

CPT-11+パニツムマブ療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>ミマイシンカプセル100mg … 2C 1日2回 朝・夕 食後 14日</p> <p>-----</p> <p>へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g/本（先発:ヒルトイト） … 2本 1日頻回 保湿 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>ハロメセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ? 分間かけて … 5 ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベクティビックス点滴静注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イリテカン注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p>	