

		休業終了日
	Day1	Day14
投薬		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>静脈内注射 … 1 大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベバシズマブ注【規格分解用】 … 1mg 初回投与は90分、問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ベバシズマブ投与後のフラッシュ用 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオロウラル注【規格分解用】 … 1mg 全開で 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL フルオロウラル注(バクスター230mL用)【規格分解 … 1mg 46時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑦ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回</p>	