

		休業終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタシコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 イリノテカン点滴開始60~90分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 3日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ハロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ファモチジン注射液20mg「トワ」2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ペバシズマブ注【規格分解用】 … 1mg 初回投与は90分、問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管③ ペバシズマブ投与後のフラッシュ用 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 イリノテカン注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 本管④ 1回</p>	

注射

テルモ糖注5%(250mL) … 1袋  
レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg  
120 分間かけて  
側管  
オキサリプラチンと同時に  
点滴 … 1  
1回

テルモ糖注5%(250mL) … 1袋  
オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg  
120 分間かけて  
本管⑤  
レボホリナートと同時に  
点滴 … 1  
1回

点滴 … 1  
大塚生食注(50ml) … 1瓶  
本管⑥  
1回

生理食塩液(5FU)【規格薬 … 1mL  
フルオウラシル注(バクスター240mL用)【規 … 1mg  
48 時間かけて  
バクスターインフュージョンポンプLV5に充填  
本管⑦  
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1  
1回

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒  
インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。  
管注 … 1  
1回