

ゲムシタビン S-1併用療法(胆管癌)

			休薬終了日
	Day1	Day15	Day28
投薬	<p>■---【投薬】 エスワンタイリ配合OD錠【規格分解用】… 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>		
注射	<p>■---【注射】 ハロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ)… 1袋 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml)… 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 本管② 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 本管③ 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】 ハロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ)… 1袋 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml)… 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 本管② 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 本管③ 点滴… 1 1回</p>	