

FEC100療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プリンペラン錠5mg … 1錠 頓用 吐き気時 5日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 3日</p> <p>-----</p> <p>アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメト) … 1C 1日1回 点滴開始60~90分前 1日</p> <p>-----</p> <p>アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメト) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>ハロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ) … 1袋 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 エビルピシン塩酸塩注射用【規格分解用】 … 1mg 15分間かけて エビルピシン1Vあたり生食10mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	