

	Day1	Day8	Day15	休薬終了日 Day28
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」 2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ホララミン注5mg(1ml) … 2管 15分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 10分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベバシズマブ注【規格分解用】 … 1mg 本管⑤ 初回投与は90分、問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」 2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ホララミン注5mg(1ml) … 2管 15分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管④ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」 2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ホララミン注5mg(1ml) … 2管 15分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与。 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 10分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベバシズマブ注【規格分解用】 … 1mg 本管⑤ 初回投与は90分、問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 点滴 … 1 1回</p>	

大塚生食注(50ml) … 1瓶
本管⑥
点滴 … 1
1回

大塚生食注(50ml) … 1瓶
本管⑥
点滴 … 1
1回