

エンホルツマブベドチン+ペムブロリズマブ療法

| | | | 休薬終了日 |
|----|--|---|-------|
| | Day1 | Day8 | Day21 |
| 投薬 | <p>■---【投薬】 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g/本（先発：ヒルドイド）… 3本 医師の指示通り 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p> | | |
| 注射 | <p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml パドセブ注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② パドセブ30mgに対し蒸留水3.3mlで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 30分間かけて 2回目以降は15分で可 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 キトルダ点滴静注【規格分解用】 … 200mg 30分間かけて 本管④ 0.2~5ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管⑤ 1回</p> | <p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml パドセブ注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② パドセブ30mgに対し蒸留水3.3mlで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 5分間かけて 1回</p> | |