

CEPP療法

			休薬終了日
	Day1	Day8	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>ラストSカプセル【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 3日</p> <p>-----</p> <p>塩酸プロカルバジンカプセル【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 10日</p> <p>-----</p> <p>プレニゾロン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 ☆☆別パック☆☆ 10日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/GPM]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/GPM]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	