

Pola+BR療法<2クール目以降>(入院用)

				休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day21
投薬	<p>■---【投薬】                      カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      リツキシマブ投与30分前に内服                      ☆☆別パック☆☆                      1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1                      1日</p>		<p>■---【投薬】                      【4mg】デカドロン錠 … 2錠                      1日1回 朝食後                      2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1                      1日</p>	
注射	<p>■---【注射】                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      グラニセトロン静注液1mg「明治」1mL … 1管                      デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶                      デカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      トレアキシ点滴静注液【規格分解用】… 1mg                      10分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml                      ポライビー注【規格分解用】… 1mg                      30分間かけて                      ポライビー30mgに対し蒸留水1.8mLで溶解                      0.2μmのインラインフィルターを通して投与                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      経過観察用                      点滴 … 1                      15分間かけて                      1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL                      リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg                      朝                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	<p>■---【注射】                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      グラニセトロン静注液1mg「明治」1mL … 1管                      デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      トレアキシ点滴静注液【規格分解用】… 1mg                      10分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>		