

A-CHP療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾン錠「タケダ」5mg … 20錠                      1日3回 毎食後 … 1                      朝食後 10                      昼食後 6                      夕食後 4                      外来の場合はケモ室へ払い出す                      5日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1                      ☆☆一包化(パック)☆☆                      1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      グラニセロン静注液1mg「明治」1mL … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      アドセリス投与前フラッシュ用                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      大塚蒸留水20ml(ml用) … 21ml                      アドセリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg                      30分間かけて                      50mg/Vに対して10.5mLの蒸留水で溶解                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1                      大塚生食注(50ml) … 1瓶                      フラッシュ用                      1回</p> <p>-----</p> <p>ゾルテム3 輸液(500ml) … 1袋                      エドキシカン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg                      90分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ドキソルビシン注[ADM/DXR]【規格分解用 … 1mg                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	