

ゲムシタビン S-1併用療法(肺癌)(術前)

			休業終了日
	Day1	Day8	Day21
投薬	<p>■---【投薬】                      エスワンタイリ配合OD錠【規格分解用】… 1mg                      Day1夕からDay15朝まで内服                      1日2回 朝・夕 食後                      14日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1                      1日</p>		
注射	<p>■---【注射】                      ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ)… 1袋                      デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶                      15分間かけて                      本管①                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml)… 1瓶                      ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】… 1mg                      30分間かけて                      本管②                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      本管③                      点滴… 1                      1回</p>	<p>■---【注射】                      ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキシ)… 1袋                      デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶                      15分間かけて                      本管①                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml)… 1瓶                      ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】… 1mg                      30分間かけて                      本管②                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      本管③                      点滴… 1                      1回</p>	